



Association Française Des Intolérants Au Gluten

Si c'était le gluten ?

*Ne pas passer à côté d'un diagnostic utile
devant une forme atypique*



AFDIAG
www.afdiag.fr

Maladie cœliaque, allergie au blé, hypersensibilité au gluten non-cœliaque

Maladie cœliaque - Intolérance au gluten : le diagnostic repose sur la détection d'anticorps sériques spécifiques (IgA anti-transglutaminase) et la confirmation par des biopsies duodénales lors d'une endoscopie, qui objectivent les anomalies histologiques suivantes : augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux, hyperplasie des cryptes et atrophie villositaire d'intensité variable. Les patients sont génétiquement prédisposés, HLA-DQ2/DQ8. La prévalence, dans les études épidémiologiques, varie de 0,5 à 1 % de la population. La maladie cœliaque atteint toutes les tranches d'âge, enfants et adultes, et elle est diagnostiquée dans 20 % des cas après 60 ans. On estime que 80 % des sujets atteints ne sont pas diagnostiqués du fait de symptômes mineurs ou de formes asymptomatiques (par exemple : carence en fer uniquement).

Allergie au blé : réaction d'hypersensibilité immédiate avec manifestations allergiques (éruption cutanée, œdème de Quincke couplé à l'effort, choc anaphylactique dans les formes les plus graves). Elle est exacerbée par l'exercice physique qui facilite l'absorption dans l'intestin des allergènes. La réaction immune est médiée par les IgE et des IgE spécifiques ont été détectées contre des épitopes des oméga-5 gliadines et des gluténines de haut poids moléculaire. Dans ce cas, il n'existe pas d'atrophie villositaire intestinale. Il s'agit d'une pathologie moins fréquente que la maladie cœliaque.

Hypersensibilité au gluten non-cœliaque : symptômes évocateurs de troubles fonctionnels digestifs (douleurs abdominales, alternance diarrhée-constipation, ballonnement abdominal) chez des sujets diagnostiqués non-cœliaques et non-allergiques, mais qui se trouvent améliorés par le régime sans gluten. Il n'existe à ce jour aucun rationnel scientifique clairement établi. L'imputabilité du rôle du gluten reste donc à démontrer. Dans ce cas, il n'existe pas d'atrophie villositaire intestinale.

Définitions G. Malamut et C. Cellier

Quelques symptômes de la maladie cœliaque

A = adulte • E = enfant


- Amaigrissement (A-E)
- Anorexie (A-E)
- Aptose buccale récidivante (A-E)
- Atteinte articulaire (A-E)
- Augmentation isolée des transaminases (A-E)
- Carence en fer/anémie ferriprive (A-E)
- Dermate herpétiforme (A-E)
- Diarrhée/ballonnement (A-E)
- Ostéopénie/ostéoporose inexpliquée (A)
- Retard de croissance pondérale (E)
- Retard de croissance staturale, voire nanisme (E)
- Retard pubertaire (E)

- Il y a de 5 à 10 fois plus de sujets qui présentent une maladie cœliaque parmi les diabétiques insulinodépendants (DID)
- Parent au premier degré avec un patient cœliaque (risque multiplié par 5 à 10)



NE PAS FAIRE DÉBUTER UN RÉGIME SANS GLUTEN AVANT D’AFFIRMER LE DIAGNOSTIC DE MALADIE CŒLIAQUE (anticorps et biopsies duodénales)

Comment diagnostiquer la maladie cœliaque ?



* EMA : anticorps anti-endomysium

** Le seul résultat positif des AC anti-tTG IgA ou AC anti-tTG IgG sans confirmation de la maladie cœliaque par endoscopie, par un spécialiste, ne doit pas faire débiter le régime sans gluten

Différents tests d'intolérances alimentaires (par IgG), immunotest ou tests urinaires, se répandent mais n'ont aucune validité scientifique

La recherche d'anticorps anti-transglutaminase aide à prendre en charge correctement le patient atteint de maladie cœliaque

- **SIMPLE** : orientation du diagnostic par une prise de sang ().
- **NON INVASIF** : chez l'enfant, l'ESPGHAN (Société européenne de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques) recommande de ne pas effectuer les biopsies duodénales dans certains cas bien précis et après avis d'un pédiatre gastro-entérologue : AC anti-tTG IgA supérieurs à 10 fois la normale, EMA positifs et présence d'HLA-DQ2 ou -DQ8. L'ESPGHAN suggère que le dosage des IgA totales soit fait en première intention, en même temps que celui des IgA anti-transglutaminase.
- **QUANTITATIF** : les résultats permettent le diagnostic de la maladie puis le suivi du patient.

Objectifs de l'AFDIAG



- **Défendre** les intérêts des malades cœliaques
- **Informé**r les malades cœliaques, le public, les professionnels de santé et de l'alimentation
- **Soutenir** la Recherche

Document réalisé par le Comité Médical de l'AFDIAG

BORDEAUX
Pr T. LAMIREAU, Pr F. ZERBIB

CLERMONT-FERRAND
Dr C. BOUTELOUP

CLICHY
Pr Y. BOUHNIC

CRÉTEIL
Pr O. CHOSIDOW

DIJON
Pr F. HUET

GRENOBLE
Pr B. BONAZ,
Dr J.-P. CHOURAQUI

LE KREMLIN-BICÊTE
Pr F. CARBONNEL,
Mme C. TERROLLE (diét.)

LILLE
Pr P. AMOUYEL,
Pr J.-F. COLOMBEL,

Pr B. CORTET, Pr E. DELAPORTE,
Pr D. TURCK

LYON
Dr F. BIENVENU, Pr B. FLOURIÉ,
Pr A. LACHAUX

MARSEILLE
Dr S. DESPLAT-JÉGO,
M^{me} M.-C. MORIN (diét.),
Pr J. SARLES

MONACO
Pr P. RAMPAL

NANTES
Pr T. MATYSIAK-BUDNIK

NICE
Pr S. SCHNEIDER

PARIS
Pr M. ALLEZ, Pr N. BROUSSE,
Dr N. CERF-BENSUSSAN,
Pr C. CELLIER, Pr J. COSNES,
Dr H. GARNIER-LENGLINE,

Pr J.-P. GIRARDET,
Pr J.-P. HUGOT,
M^{me} M.-A. LE BARS (diét.),
Dr G. MALAMUT,
Pr J. POUCHOT,
Pr J. SCHMITZ, Pr P. TOUNIAN,
Dr V. VERKARRE, Dr J. VIALA

REIMS
Pr G. CADIOT

RENNES
Pr J.-F. BRETAGNE,
Dr A. DABADIE

ROUEN
Dr O. MOUTERDE

STRASBOURG
Pr B. DUCLOS

TOULOUSE
Pr J.-P. OLIVES

TOURS
Pr T. LECOMTE

Partenaires



Illustration : Stéphane Humbert-Basset



AFDIAG
Association Française Des Intolérants Au Gluten
15 rue d'Hauteville 75010 PARIS
Tél. 01 56 08 08 22 - Fax. 01 56 08 08 42
Brigitte JOLIVET - presidente.afdiag@gmail.com
afdiag@gmail.com - www.afdiag.fr